

آداون

مخلوط ریز مغذی ها

محلوط غلیظ برای تهیه محلوط جهت انفوزیون

قبل از استفاده از این دارو برگه راهنما را به دقت مطالعه نمایید.

- این برگه را با خود نگدارید. شاید لازم شود دوباره آن را مطالعه کنید.
 - در صورت بروز سوالات بیشتر، به پزشک یا داروساز مراجعه نمایید.
 - در صورت بروز عوارض جانبی به پزشک یا داروسازتان اطلاع دهید.
- این شامل عوارض جانبی فهرست نشده در این راهنما نیز می باشد.

۱. آداون چیست و چه کاربردی دارد؟

آداون دارویی است که حاوی ریزمغذی هاست. ریزمغذی ها مواد شیمیایی با مقادیر جزئی است که بدن برای انجام فعالیت طبیعی به آنها نیاز دارد. آداون هنگامی که امکان مصرف خوراکی وجود ندارد، به صورت وریدی تجویز می شود. معمولاً این دارو به عنوان بخشی از رژیم غذایی متعادل شده وریدی به همراه پروتئین، چربی، کربوهیدرات، املاح و ویتامینها مصرف می شود.

۲. قبل از مصرف آداون چه نکاتی را باید بدانید؟

در موارد ذیل نباید آداون برای شما تجویز شود:

- در صورت داشتن حساسیت به هر یک از اجزای فرمولاسیون (طبق فهرست بخش ۶). در صورت بروز جوش یا هر واکنش آلرژیک دیگری (نظیر خارش، تورم لب یا صورت، یا تنگی نفس) فوراً به پزشکتان اطلاع دهید.
- در صورت انسداد صفراوی
- در صورت ابتلا به بیماری Wilson (نوعی اختلال ژنتیکی که در آن بدن مس تولید می کند)

موارد هشدار و احتیاط:

چنانچه مشکل کبدی یا کلیوی دارید با پزشکتان صحبت کنید.

پزشکتان ممکن است جهت بررسی شرایط شما آزمایشات معمول خون را انجام دهد.

آداون و سایر داروها:

در صورتی که دارویی مصرف می کنید یا می خواهید به طور همزمان مصرف کنید، به پزشک یا داروسازتان اطلاع دهید.

بارداری و شیردهی:

در صورت بارداری ، شیردهی یا احتمال بارداری ، پیش از مصرف این دارو با پزشکتان مشورت کنید.

رانندگی و کار با ماشین آلات:

آداون اثری بر رانندگی یا کار با ماشین آلات ندارد.

۳. نحوه تجویز آداون

این دارو توسط پزشک برایتان تجویز می شود. تجویز به صورت انفوزیون وریدی است. دوز تجویزی توسط پزشک مشخص می شود. دوز توصیه شده برای بزرگسالان ۱۰ میلی لیتر در روز است. آداون قبل از تجویز باید با محلول دیگری رقیق شود. پزشک یا پرستارتان قبل از تجویز از نحوه آماده سازی صحیح آداون اطمینان حاصل می کنند.

مصرف در کودکان:

دوز توصیه شده برای کودکان با وزن بیش از ۱۵ کیلوگرم، معادل ۰,۱ میلی لیتر به ازای هر کیلوگرم وزن بدن در روز است.

اگر آداون را زیاد مصرف کنید:

امکان مصرف آداون بیش از حد تجویز شده بسیار غیر محتمل است زیرا پزشک یا پرستارتان در حین درمان شما را مانیتور می کنند. با این حال چنانچه گمان کردید بیش از حد آداون دریافت کرده اید، فوراً "به پزشک یا پرستارتان اطلاع دهید.

چنانچه سوالات بیشتری در خصوص این دارو دارید، از پزشک یا پرستارتان سوال کنید.

۴. عوارض جانبی ممکن

هیچ عارضه جانبی شناخته شده ای از مصرف آداون گزارش نشده است. با این حال در صورت بروز هر عارضه ناخواسته ای به پزشک یا پرستارتان اطلاع دهید.

۵. نحوه نگهداری آداون

دور از دسترس کودکان نگهداری کنید.

بعد از پایان یافتن تاریخ انقضای مندرج روی جعبه و ویال از مصرف این دارو خودداری کنید. تاریخ انقضا به آخرین روز ماه مربوط می شود.

این دارو به هیچ شرایط خاصی برای نگهداری نیاز ندارد.

پزشک و داروساز بیمارستان مسئول نگهداری صحیح، تجویز و امحای انفوزیون آداون هستند.

پس از رقیق کردن: افزودن آداون باید بلافاصله قبل از شروع انفوزیون صورت گیرد و باید طی ۲۴ ساعت مصرف شود. چنانچه فوراً مصرف نشود، مسئولیت زمان و شرایط قبل از مصرف به عهده مصرف کننده است و نباید بیش از ۲۴ ساعت در دمای ۲ تا ۸ درجه سانتیگراد باشد. مگر آنکه اختلاط در محل کنترل شده و شرایط آسپتیک معتبر شده صورت گرفته باشد.

هرگونه داروی باقیمانده پس از درمان باید از طریق روشهای تایید شده بیمارستانی امحا شود.

۶. محتویات بسته بندی و سایر اطلاعات

محتویات انفوزیون آداون

- مواد موثره در یک آمپول (۱۰ میلی لیتری) عبارتست از:

Chromic chloride hexahydrate	53.3 µg	-
Copper chloride dihydrate	1.02 mg	-
Ferric chloride hexahydrate	5.40 mg	-
Manganese chloride tetrahydrate	198 µg	-
Potassium iodide	166 µg	-
Sodium fluoride	2.10 mg	-
Sodium molybdate dihydrate	48.5 µg	-
Sodium selenite anhydrous	173 µg	-
Zinc chloride	10.5 mg	-

سایر ترکیبات شامل زایلیتول، هیدروکلریک اسید و آب قابل تزریق است.

شکل آداون و محتویات بسته بندی

آداون محلولی شفاف و تقریباً بی رنگ از ریز مغذی هاست.

آداون به صورت محلول کنسانتره در آمپولهای پلی پروپیلنی ۱۰ میلی لیتری و به تعداد ۲۰ آمپول در یک جعبه عرضه می شود.

شرکت تولید کننده

فرزنیوس کابی – نروژ و سوئد

تاریخ آخرین بازرنگری

ژانویه ۲۰۱۴

شرکت وارد کننده

درمان یاب دارو